

THÔNG BÁO

Chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng và ngăn chặn chủng Virut ngoại lai SAT1

Bệnh Lở mồm long móng là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho ngành chăn nuôi. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang đứng trước thách thức mới khi chủng vi rút SAT1 đã xuất hiện tại các tỉnh giáp biên giới nước ta từ đầu tháng 4/2026. Đáng lưu ý, các loại vắc xin LMLM hiện đang lưu hành tại Việt Nam (tuýp O, A, Asia1) không có khả năng bảo hộ đối với chủng SAT1 này.

Hiện tại thời tiết đang diễn biến phức tạp, mưa nhiều, ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát triển và gây bệnh. Để kịp thời phòng chống dịch Lở mồm long móng và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi. Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Hồng yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Đối với bệnh Lở mồm long móng: Đây là bệnh truyền nhiễm xảy ra trên các loài động vật móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai. Bệnh lây lan rất mạnh thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa con ốm và con khỏe, hoặc gián tiếp qua môi trường, thức ăn, nguồn nước và các phương tiện vận chuyển. Vi rút có sức đề kháng cao, có thể tồn tại nhiều tháng trong thịt đông lạnh và khoảng 7 ngày trong chất thải hữu cơ tại chuồng nuôi.

2. Đặc điểm nhận biết và tác hại: Bà con cần đặc biệt theo dõi đàn gia súc để phát hiện sớm các dấu hiệu sau:

- Triệu chứng: Gia súc sốt cao trên 40°C, ủ rũ, kém ăn hoặc bỏ ăn.
- Biểu hiện điển hình: Miệng chảy nhiều nước dãi sủi bọt trắng; xuất hiện mụn nước ở lợi, lưỡi, vành mũi, vành móng, kẽ móng và đầu vú.
- Hậu quả: Khi mụn nước vỡ sẽ gây lở loét, làm gia súc đau đớn, đi lại khó khăn, trường hợp nặng có thể gây long móng.
- Tỷ lệ chết: Ở gia súc trưởng thành, tỷ lệ chết chỉ từ 1-5%, nhưng trên con non (bê, nghé, lợn con), tỷ lệ chết thường rất cao, trên 20% do vi rút tấn công vào cơ tim.

3. Các biện pháp phòng bệnh chủ động: Để ngăn chặn dịch bệnh, mỗi cơ sở chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Chăm sóc và nuôi dưỡng: Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, định kỳ khử trùng chuồng trại ít nhất 1 lần mỗi tuần bằng nước vôi, vôi bột hoặc các loại hóa chất sát trùng như Iodine, Chlorine.

- Quản lý con giống: Chỉ nhập giống rõ nguồn gốc, đã tiêm phòng vắc xin. Gia súc mới nhập về phải được nuôi cách ly theo dõi ít nhất 21 ngày trước khi nhập đàn.

- Tiêm phòng: Chủ động tiêm vắc xin LMLM cho đàn gia súc định kỳ 2 lần mỗi năm theo đúng lịch của cơ quan thú y địa phương.

4. Khuyến cáo "5 KHÔNG" trong phòng chống dịch ngành Thú y đề nghị bà con nghiêm túc thực hiện cam kết:

- KHÔNG giấu dịch.
- KHÔNG mua gia súc hoặc sản phẩm gia súc mắc bệnh.
- KHÔNG bán chạy gia súc mắc bệnh.
- KHÔNG chăn thả rông gia súc ra ngoài môi trường.
- KHÔNG vứt xác gia súc chết ra nơi công cộng, sông ngòi, ao hồ.

5. Hành động khi phát hiện gia súc nghi mắc bệnh: Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu sốt hoặc lở loét, bà con cần bình tĩnh thực hiện ngay:

- Cách ly tức thì gia súc nghi mắc bệnh ra khu vực riêng.
- Báo cáo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.
- Tuyệt đối không bán tháo hay vận chuyển gia súc, thức ăn, chất thải ra khỏi khu vực chăn nuôi để tránh làm phát tán mầm bệnh cho cộng đồng.


6. Tổ chức thực hiện

Trưởng xóm và các Hợp tác xã SXKD DVNN thông báo rộng rãi nội dung thông báo này trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn xóm để bà con nông dân nắm bắt kịp thời thông tin.

Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Hồng trân trọng đề nghị./

Nơi nhận:

- UBND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng K tế;
- Các HTX SXKD DVNN;
- Các cơ sở thôn xóm;
- Lưu: VT..



Trần Thị Thu Hương

2/1

