

Số: /HD-TTĐVSNC

Vạn Thắng, ngày tháng 5 năm 2026

HƯỚNG DẪN Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Đông xuân

Qua kiểm tra đồng ruộng, trà Xuân muộn trên địa bàn xã Vạn Thắng đang ở giai đoạn làm đòng - trổ bông, chín sữa. Trên các ruộng lúa gieo cấy dày xanh tốt, ruộng trũng, hầu hết chân ruộng thường bị rầy gây hại nặng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân 2 chấm tiếp tục phát sinh gây hại trên các diện tích lúa chưa trổ. Ngoài ra bệnh khô vằn, bạc lá tiếp tục phát sinh gây hại. Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây hại của sâu bệnh. Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công đề nghị :

+ Các HTX dịch vụ nông nghiệp; Trưởng các thôn, xóm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với rầy nâu - rầy lưng trắng lúa 3:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giám sát chặt chẽ diễn biến, mật độ, mức độ nhiễm rầy trên từng cánh đồng, xứ đồng; chỉ đạo phun trừ cho các diện tích có mật độ ≥ 1.000 con/m² khi rầy đa số tuổi 1-3.

- Thời gian phòng trừ dự kiến:

+ Đối với diện tích lúa đã trổ: tập trung chỉ đạo phun trừ từ 10 - 18/5.

+ Đối với diện tích chưa trổ (trổ sau 10/5): chỉ đạo phun trừ từ 25 - 30/5.

- Sử dụng một trong các loại thuốc như: Nibas 50EC, Bassa 50EC, Vibasa 50EC... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (Chú ý khi phun nhất thiết phải rẽ hàng 0,8 -1 m để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy).

- Có thể sử dụng các loại thuốc Titan 600WG; TT Led 70WG; Dyman 500WP; Florid 700WP; Ramsuper 75WP; Palano 600WP; Vuachest 800WG pha thuốc theo đúng nồng độ trên nhãn mác, phun đảm bảo 32 lít nước thuốc/sào thì khi phun không cần phải rẽ lúa.

* Lưu ý: Sau phun thuốc 3 ngày kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn trên ngưỡng phòng trừ thì phải phun lại ngay. Các diện tích lúa đã chín khoảng 80% chỉ đạo gặt chạy rầy (trước chín hoàn toàn 7 ngày).

2. Đối với sâu đục thân 2 chấm: có hiện tượng dồn mật độ gây hại các diện

tích lúa chưa trổ. Chỉ đạo phun trừ cho các diện tích có mật độ ổ trứng $\geq 0,3$ ổ/m² vào giai đoạn ngay khi lúa bắt đầu trổ. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Voliam targo 063SC; Prevaton® 200SC; Incipio® 200SC; Chlorferan 240SC-vua đục thân ...liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Đối với bệnh khô vằn trên các diện tích lúa đã trổ xong đến đở đuôi: kiểm tra và chỉ đạo phun trừ cho các diện tích có tỷ lệ bệnh trên 10% vết bệnh cấp 5 - 7. Sử dụng thuốc tiếp xúc theo hướng dẫn trên nhãn mác như Validacin 5SL; Vali 5SL; Valivithaco 5SC, 5WP... phun thuốc trực tiếp vào vết bệnh.

4. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, lúa cỏ trên các diện tích lúa chưa trổ: tiếp tục chỉ đạo phòng trừ theo Hướng dẫn số 09/HD-TTĐVSNC ngày 29/4/2026 của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công.

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng trên các phương tiện thông tin của HTX xã dịch vụ nông nghiệp, thôn, xóm. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả phòng trừ sau phun thuốc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trên đây là hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công về công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại cuối vụ./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch (b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Các HTX dịch vụ NN;
- Trưởng các thôn, xóm;
- Lưu TTĐVSNC./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Phương Lan