

Số: /TB-UBND

Yên Cường, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Phòng trừ sâu bệnh cuối vụ Xuân năm 2026

Hiện nay trà lúa Xuân trên địa bàn xã đang ở giai đoạn lúa trổ-chín sữa. Kết quả kiểm tra của Trung tâm DV sự nghiệp công xã cho thấy đến nay rầy lúa 3 (chủ yếu rầy nâu) đang nở rộ, phổ biến ở tuổi 1,2,3. Mật độ rầy trung bình 80-150 con/m², nơi cao 200-300 con/m², cục bộ ≥ 1000 con/m² (như xóm Nguồn HTX Nam Cường, Tân Thành HTX Yên Lộc...)

Dự kiến rầy lúa 3 tiếp tục nở rộ trên các diện tích lúa đã trổ -chín từ ngày 10 - 20/5, có hiện tượng gôi lúa tăng dần mật độ đến cuối vụ nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời sẽ gây cháy diện hẹp đặc biệt các ruộng gieo cấy dày xanh tốt, bị đổ ngã, ruộng trũng, hâu, chân ruộng thường bị rầy gây hại nặng làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Để bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2026, UBND xã yêu cầu, các HTX DVNN và nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với rầy nâu-rầy lưng trắng lúa 3:

Trung tâm DV sự nghiệp công và các HTXDVNN cử cán bộ tăng cường kiểm tra đồng ruộng theo dõi diễn biến mật độ, mức độ nhiễm rầy trên từng cánh đồng, xứ đồng; chỉ đạo nhân dân phun trừ cho các diện tích có mật độ ≥ 1.000 con/m² khi rầy từ tuổi 1-3.

Thời gian phòng trừ : từ 15 - 20/5.

- Sử dụng một trong các loại thuốc lưu dẫn như: Dyman 500WP; Florid 700WP; Ramsuper 75WP; Vuachest 800WG, Chess 50WG...pha thuốc theo đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phun đảm bảo 32 lít nước thuốc/sào thì khi phun không cần phải rẽ lúa.

*** Lưu ý:**

- Sau khi phun chưa đủ 4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại.

- Chỉ phun trừ rầy cho những diện tích có mật độ rầy ≥ 30 con/khóm (≥ 1.000 con/m²) tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường

- Sau phun thuốc 3 ngày kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn trên ngưỡng phòng trừ thì phải phun lại ngay. Các diện tích lúa đã chín khoảng 80% chỉ đạo gặt chạy rầy (trước chín hoàn toàn 7 ngày).

2. Bệnh Khô Vằn: Kiểm tra và chỉ đạo phun trừ cho các diện tích có tỷ lệ bệnh >10%. Sử dụng thuốc tiếp xúc theo hướng dẫn trên nhãn mác của nhà sản xuất như: Validacin 5SL, Vali 5SL, Valivithaco 5SC....phun thuốc trực tiếp vào vết bệnh.

3. Đối với lúa cỏ: Phát động nông dân cắt bỏ các bông lúa cỏ đem tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn lúa chổ bông – ngậm sữa, tránh để hạt lúa cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau. Khi thu hoạch lúa Mùa cần vệ sinh máy gặt sạch sẽ; chú trọng vệ sinh đồng ruộng và kênh mương để hạn chế sự lây lan từ vùng này sang vùng khác qua khâu thu hoạch và nguồn nước.

4. Chuột: tiếp tục gây hại đến cuối vụ. Từ giai đoạn này trở đi chuột ít ăn môi bả vì nguồn thức ăn rồi dào và hấp dẫn. Khuyến cáo nông dân diệt chuột bằng biện pháp thủ công như sử dụng bẫy bán nguyệt và đào bắt thủ công.

Đề nghị các HTX SXKD DVNN; cơ sở thôn xóm, các hộ xã viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Nông nghiệp& Môi trường;
- Các HTX SXKD DVNN;
- Các thôn, xóm;
- Lưu: VT, TTDVSNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trình